

## Alpenmannstreu

keine Beschreibung zur Zeit verfügbar

---

### Bartnelke



**Standort:** lichte Wälder und Magerwiesen

Halbtrockenrasen

**Aussaart:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Juni - September

Bestäuber: Wildbienen, Fliegen und  
Käfer

**Verwendung:** Zierpflanze

---

### Bienenkugeldistel



**Standort:** trockene Ruderalfluren

nährstoffreiche, besonders steinige

Böden, stickstoffreiche Standorte,

Lichtpflanze

**Aussaart:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Juni - August

Bestäuber: Bienen, Wespen, Tagfalter

**Verwendung:** Zierpflanze

---

### Blasenleimkraut



**Standort:** auf Wiesen, Weiden, Böschun-

gen, Pionierpflanze, trocken, sonnig,

kalkhaltiger Boden

**Aussaart:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Juni - Oktober,

**Bestäuber:** langrüsselige Bienen und  
Nachtfalter

**Verwendung:** Wildgemüse (Laubblätter),  
Zierpflanze für Stein- und Wildgärten

---

### Echtes Seifenkraut



**Standort:** im Aubereich, an Ufern und an feuchten Ruderalstellen, nährstoffreiche und frische Stein-, Sand-, Kiesböden

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juni – Oktober

Bestäuber: Nachtfalter, Bienen, Schwebfliegen

**Verwendung:** Wurzeln als Seifenersatz, Volksarznei und Zierpflanze

---

### Eigentliche österr. Königskerze



**Standort:** Halbtrockenrasen, Eichenwälder, warme, trockene Lagen

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juli - September

Bestäuber: kurzrüsselige Bienen, Käfer, Fliegen, Schwebfliegen

**Verwendung:** Zierpflanze in Naturgärten,

---

### Färber-Scharte



**Standort:** Feuchtwiesen, bodensaure Eichen-, wälder, feuchte, mäßig nährstoff- und basenreiche Lehm- und Tonböden  
stark gefährdet!

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juli – September

Bestäuber: Bienen und Schmetterlinge

**Verwendung:** Zierpflanze, ehemalige Färberpflanze (gelb)

---

## Färberwau



**Standort:** auf Waldschlägen,  
Rohbodenpionier, trockene nährstoffreiche  
Standorte

Charakterart der staudendominierten  
Ruderalfluren

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Juni - September

**Bestäuber:** kleine Wildbienen, Fliegen und Käfer

**Verwendung:** Färbepflanze (gelb und grün)  
für Wolle, Seide und Leinen

---

## Ferkelkraut



**Standort:** frische bis mäßig trockene, nährstoffreiche,  
basenreiche, kalkarme Lehm- und Tonböden,  
trockene Magerrasen

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juni - Oktober,

**Bestäuber:** verschiedene Insekten, Bienen

**Verwendung:** Zierpflanze, junge Blätter  
in Salaten, Blütenknospen als Kapernersatz

---

## Gewöhnlicher Rauhaar Löwenzahn



**Standort:** Weiderasen, Wiesen,  
Moorwiesen, lichte Wälder

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen  
und anwalzen

**Blüte:** Juni - Oktober

**Bestäuber:** wichtige Bienenweide

**Verwendung:** Heilpflanze früherer  
Jahrhunderte, Krebsvorsorge

---

## Groß-Klappertopf



**Standort:** Lehmige Feuchtwiesen,  
wechselfrische Halbtrockenrasen,  
Wald- und Gebüschsäume, selten

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Mai – September  
Bestäuber: langrüsselige Hummeln,  
selten Schmetterlinge

**Essbare Teile:** Zierpflanze in Wildblumenwiesen

---

## Großblütige Königskerze



**Standort:** trockene bis frische nährstoffreiche,  
meist kalkhaltige Böden, auf Schuttplätzen,  
Wegrändern, Dämmen, Lichtpflanze

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Juni - September  
Bestäuber: kurzrüsselige Bienen. Käfer,  
Fliegen, Schwebfliegen

**Verwendung:** Hustenmittel (Blüten),  
Volksmedizin (Rheuma)

---

## Großer Wiesenknopf



**Standort:** in wechselfeuchten Nasswiesen und  
Moorwiesen, nährstoffarmer Boden, sonnig.  
Charakterart der Pfeifengraswiesen und  
der Sumpfdotterblumenwiesen

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juni - September,

**Bestäuber:** viele verschiedene Insekten,  
Schmetterlinge: Ameisenbläuling!

**Verwendung:** Kraut und Wurzel zur  
Wundbehandlung und gegen Durchfall

---

## Heilziest



- Standort:** feuchte, basenreiche oft kalkarme Böden an etwas wärmeren Standorten, wechsellückene Streuwiesen
- Aussaart:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen
- Blüte:** Juni - September,
- Bestäuber:** Hummeln, Schwebfliegen, Schmetterlinge (Heilziest-Dickkopffalter!)
- Verwendung:** Volksmedizin, Atemwege, Magen-Darm-Trakt, Schmerzen
- 

## Hornklee



- Standort:** Wiesen, Halbtrockenrasen, Wegränder, warme mäßig trockene nährstoffreiche, basenreiche Böden
- Aussaart:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen
- Blüte:** Mai - September
- Bestäuber:** Bienen, Schmetterlinge (Hauhechel-Bläuling)
- Verwendung:** Volksmedizin, roh giftig! Zierpflanze
- 

## Klatschmohn



- Standort:** Ackerränder, Brachen, Trockene Ruderalstellen, basenliebend, Pionierpflanze
- Aussaart:** oberflächlich ausstreuen Und anwalzen
- Blüte:** Mai - Juli
- Bestäuber:** verschiedene Insekten
- Verwendung:** Blütenblätter als essbare Deko, junge Blätter als Salat
-

## Kleine Braunelle



**Standort:** auf feuchten Wiesen oder Weiden, Halbtrockenrasen

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juni - Oktober,

**Bestäuber:** Hummeln und andere Hautflügler

**Verwendung:** junge Pflanzen als Gemüse oder Gewürz, Heilpflanze (Herpes simplex)

---

## Kriechender Günsel



**Standort:** auf frischen, nährstoffreichen, neutralen bis mäßig sauren, humosen Lehmböden; Charakterart der Fettwiesen und der Schattlaubwälder

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** April bis Juni

**Bestäuber:** viele verschiedene Insekten

**Verwendung:** Tee gegen Rheuma, Magengeschwüre, Durchfall, Angina, Hautentzündungen; Zierpflanze

---

## Kuckuckslichtnelke



**Standort:** auf feuchten Wiesen, mäßig nährstoffreiche Böden,

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Mai - Juli

**Bestäuber:** langrüsselige Bienen und Schmetterlinge

**Verwendung:** Zierpflanze für Stein- und Wildgärten

---

## Langblättriger Ehrenpreis



**Standort:** in feuchten Moorwiesen, Gräben, Uferstaudenfluren, wechsellasse, nährstoffreiche, basenreiche Böden, wärmebedürftig, gefährdet!

**Aussaart:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juni - August,

**Bestäuber:** Hummeln und andere Hautflügler

**Verwendung:** Blume des Jahres 2018, Zierpflanze

---

## Löwenzahn



**Standort:** Fettwiesen, Ruderalgesellschaften, tiefgründige Ton- und Lehm Böden, Pionierpflanze

**Aussaart:** oberflächlich ausstreuen  
Und anwalzen

**Blüte:** April - Mai

**Bestäuber:** wichtige Bienenweide

**Verwendung:** Sirup oder Gelee aus Blüten, junge Blätter als Salat, medizinische Extrakte

---

## Moorabbiss



**Standort:** Sumpfwiesen, feuchte Wiesen, sonniger bis halbschattiger Standort, kalkarme Böden, stark gefährdet!

**Aussaart:** oberflächlich ausstreuen  
und anwalzen

**Blüte:** Juni – September (Oktober)

**Bestäuber:** Wildbienen, Zweiflügler  
Schmetterlinge

**Verwendung:** Zierpflanze

---

## Odermenning



**Standort:** magere Weiderasen, Waldränder

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen  
und anwalzen

**Blüte:** Juni - September

**Bestäuber:** Schwebfliegen, Fliegen, Bienen

**Verwendung:** Heilpflanze (Entzündungen Mund und Rachen, Durchfall), wichtigste Bachblüte (König aller Kräuter), Färberpflanze gelb

---

## Pastinak



**Standort:** basen- und oft kalkreiche  
und stickstoffhaltige Böden

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen  
und anwalzen

**Blüte:** Juli - September,

**Bestäuber:** Insekten aller Arten

**Verwendung:** alle Pflanzenteile  
Essbar (Rohkost), appetitanregend,  
harntreibend

---

## Pfirsichblättrige Glockenblume



**Standort:** Frischwiesen, Magerrasen,

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen  
Und anwalzen

**Blüte:** Juni - August

**Bestäuber:** verschiedene Insekten

**Verwendung:** Zierpflanze

---



## Prachtkönigskerze



**Standort:** Trockenrasen, Eichenwälder,  
warme, trockene Lagen, stark gefährdet!

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Juni - Juli

**Bestäuber:** kurzrüsselige Bienen. Käfer,  
Fliegen, Schwebfliegen

**Verwendung:** Zierpflanze in Naturgärten,

---

## Rainfarn



**Standort:** auf sommerwarmen, nicht zu  
trockenen, nährstoffreichen, schwach basisch  
bis basischen, humosen Böden

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juli - September,

**Bestäuber:** Hummeln, Wildbienen, Schmetterlinge

**Verwendung:** in der Imkerei als Rauch-  
mittel, Färbepflanze, Duftpflanze (insekten-  
abwehrend), Rainfarnöl ist giftig

---

## Schlitzblatt Karde



**Standort:** an Waldrändern, in Auen,  
auf Ruderalstellen, feuchte, nährstoff- und  
basenreiche Lehm- und Tonböden  
stark gefährdet!

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Juli – August

**Bestäuber:** Langrüsselige Hummeln  
und Schmetterlinge

**Verwendung:** Zierpflanze

---

## Sibirische Schwertlilie



**Standort:** in sumpfigen Au- und  
Waldwiesen, nährstoffarmer Boden, sonnig  
Charakterart der Brenndolden-Auwiesen  
und Pfeiffengraswiesen

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Mai – Juni,

**Bestäuber:** größere Insekten, Hummeln, Schmetterlinge

**Verwendung:** Zierpflanze

---

## Teufelsabbiss



**Standort:** wechselfeuchte, basenreiche,  
mäßig saure und humose Böden ,  
Magerkeitszeiger

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juli - September,

**Bestäuber:** Wildbienen, Zweiflügler  
Schmetterlinge

**Verwendung:** Zierpflanze

---

## Violette Königskerze



**Standort:** basenreiche, sandige oder  
lehmige, nährstoffarme Böden, Trocken-  
rasen, gefährdet!

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Mai - Juni

**Bestäuber:** kurzrüsselige Bienen, Käfer,  
Fliegen, Schwebfliegen

**Verwendung:** Zierpflanze in Naturgärten,  
Volksmedizin

---

## Wegwarte



**Standort:** Wegränder, Brachen, Weiden,  
auf trockenen Ruderalstellen, salztolerante  
Pionierpflanze, nährstoffreiche Böden

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen  
und anwalzen

**Blüte:** Juni - Oktober

**Bestäuber:** Bienen und Schwebfliegen

**Verwendung:** Wildsalat, Homöopathie  
Zauberpflanze, Kaffeeersatz,  
Functional Food

---

## Weisse Königskerze



**Standort:** basenreiche, sandige oder  
lehmige, nährstoffarme Böden, Trocken-  
rasen, gefährdet!

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Mai - Juni

**Bestäuber:** kurzzüsselige Bienen, Käfer,  
Fliegen, Schwebfliegen

**Verwendung:** Zierpflanze in Naturgärten,  
Volksmedizin

---

## Wiesenbärenklau



**Standort:** lockere, feuchte Böden,  
in Fettwiesen und Staudenfluren

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen  
und anwalzen

**Blüte:** Juni - September,

**Bestäuber:** Mücken, Fliegen, Hautflügler,  
Schmetterlinge, Fransenflügler und Käfer

**Verwendung:** junge Blätter und Sprosse  
als Wildgemüse und gutes Futter für  
Kaninchen

---

## Wiesenbocksbart



**Standort:** in Fettwiesen, frische, nährstoff- und basenreiche, mittel- bis tiefgründige Böden, keine Staunässe! Charakterart der Glatthaferwiesen

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Mai – August (schönes Wetter)

**Bestäuber:** Bienen, Schmetterlinge, Hummelschweber

**Essbare Teile:** Trieb der jungen Pflanze (schmeckt wie Spargel), Wurzel (ähnl. Schwarzwurzel)

---

## Wiesensalbei



**Standort:** kalkhaltige, nährstoffreiche Böden in trockener, sonniger Lage, ausdauernde Pflanze, braucht viel Licht

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Ende Mai – August,

**Bestäuber:** Hummeln

**Essbare Teile:** Blätter als Gewürz wie Küchen-Salbei (weniger intensiv!)

---

## Wilde Karde



**Standort:** an Ufern, Wegen, auf Weiden, auf Ruderalstellen

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und anwalzen

**Blüte:** Juli – August

**Bestäuber:** Langrüsselige Hummeln und Schmetterlinge

**Verwendung:** Zierpflanze (Trockenblumen-Sträuße), Heilpflanze (Wurzeltinktur)

---

## Wilde Möhre



**Standort:** in Frischwiesen und –weiden,  
in Halbtrockenrasen und nährstoffreichen  
Stauden- und ausdauernden Unkrautfluren,  
trockenwarm

**Aussaat:** oberflächlich ausstreuen und  
anwalzen

**Blüte:** Mai - September,

**Bestäuber:** Käfer Fliegen, Sandbienen,  
Schmetterlinge: Schwalbenschwanz!

**Essbare Teile:** Wurzel

---